



# LA GAMBERGE DES GAMBADÉURS

N°32  
février  
2015

ou  
LA GAZETTE DE VITALITE

Journal d'informations culturelles paraissant après une randonnée

Sortie du 1<sup>er</sup> février 2015 – Fontainebleau – animateur Philippe

## LE HOUX

*Le houx commun est un arbuste à croissance très lente, à port buissonneux, dont la taille adulte est généralement de quatre à six mètres.*

Le houx (*Ilex aquifolium*), qui peut vivre jusqu'à 300 ans et au-delà, est un arbuste à feuillage persistant de la famille des aquifoliacées. (de *acus*, aiguille et *folium*, feuille)

Le terme « houx » vient du vieux bas-francique *hulis*.

Un lieu planté de houx s'appelle une houssaie ou une houssière.



C'est une **espèce dioïque** (avec des individus mâles et femelles séparés). (on peut néanmoins trouver des individus monoïques). Les fleurs blanches, de petite taille (6 mm de diamètre environ) sont groupées en petites cymes apparaissant à l'aisselle des feuilles vers mai-juin.

Les fruits, qui n'apparaissent que sur les pieds femelles, sont de petites drupes sphériques de 7 à 10 mm de diamètre, d'un rouge éclatant, parfois jaunes, à maturité, qui contiennent quatre noyaux, enserrant une graine lignifiée.

Ces fruits qui mûrissent en fin d'été sont toxiques. Grâce à leur persistance hivernale, le houx est une espèce précieuse pour certaines espèces d'oiseaux qui s'en nourrissent, comme les merles et les grives. Sa forme buissonnante est intéressante également pour former un couvert au gibier dans les bois.

Le bouturage est le seul moyen de reproduire cet arbre à l'identique; il exige cependant un peu de patience car, du fait de leur croissance lente, les jeunes plants demandent plusieurs années pour atteindre une bonne taille.

1. En été, coupez des rameaux latéraux jeunes mais déjà bien rigides de 15 cm de longueur. Supprimez quelques feuilles à la base et l'extrémité du rameau.
2. Trempez la base de la bouture dans de la poudre d'hormone. Plantez dans un mélange composé à parts égales de sable et de tourbe, sous châssis, en recouvrant d'un plastique transparent. Laissez tout l'hiver sous châssis (température optimale : 5 à 7 C).
3. Plantez les boutures au jardin le printemps suivant. Pour avoir des jeunes houx plus vigoureux, cultivez-les 2 ans en pot avant la plantation définitive au jardin.



### MOTS CROISÉS

Solution du n°31 :  
Tête de lit SOURCE

Aujourd'hui :  
Cerise de Noël pour les merles  
□□□□